

Unapređenje pristupa prevenciji HIV-a i drugih polno prenosivih infekcija u MSM populaciji

Ovo istraživanje je deo projekta "Unapredi svoje zdravlje" podržano od strane ViiV Healthcare, a u okviru programa Positive Action. Istraživanje je sprovedlo Udruženje Crvena linija kako bi se ispitalo u kolikoj meri se MSM populacija (muškarci koji imaju seks sa muškarcima) sa teritorije Grada Novog Sada upušta u rizične seksualne odnose i u kolikoj meri je zastupljena njihova zdravstvena briga testiranja na HIV.

Opšti cilj projekta je poboljšati dijagnostifikovanje i prevenciju HIV-a i drugih seksualno prenosivih infekcija (STI) među MSM populacijom i unaprediti kontinum brige novodijagnostikovanih osoba sa HIV-om u Novom Sadu.

Istraživanje je sprovedeno u septembru 2018. godine. U istraživanju su učestvovali pripadnici MSM populacije. Najveći deo upitnika je popunjeno putem onlajn ankete koja je promovisana na sajtu Gayromeo. Ovim putem je popunjeno čak 98% anketa, dok je ostalih 2% popunjeno ručno u prostorijama Udruženja.


Ukupan broj popunjenih anketa iznosi 185, dok je 30 anketa (16%) neispravno ili nepotpuno popunjeno. Iz tog razloga, za uzorak u ovom istraživanju je uzeto 155 pravilno popunjenih anketa.

| | |
|--|-----|
| Ukupan broj popunjenih anketa | 185 |
| Ukupan broj neispravno popunjenih anketa | 30 |
| Ukupan uzorak za analizu | 155 |

REZULTATI ISTRAŽIVANJA

U istraživanju je učestvovalo 155 muškaraca koji imaju seks sa muškarcima. Najveći broj ispitanika se nalazi u uzrasnoj grupi od 25 do 34 godina (44%), a najmanji u uzrasnoj grupi od preko 65 godina (1%). U uzrasnoj grupi od 55 do 64 godine starosti nije popunjena ni jedna anketa. Imajući u vidu da je velika većina anketa popunjena putem elektronskih medija, mali broj anketa u uzrasnim kategorijama preko 55 godina nije začuđujuć.

| Uzrast ispitanika | |
|-------------------|----|
| 16 - 24 godina | 33 |
| 25 - 34 godina | 68 |
| 35 - 44 godina | 38 |
| 45 - 54 godina | 14 |
| 55 - 64 godina | 0 |
| 65 i više godina | 2 |



Grafikon 1. Uzrast ispitanika po različitim uzrasnim kategorijama

Istraživanjem je utvrđeno da je čak 70% (108 ispitanika) ima završeno više, visoko i fakultetsko obrazovanje, dok je samo 1% ispitanika sa završenim osnovnoškolskim obrazovanjem.

| Stepen obrazovanja ispitanika | |
|-------------------------------|-----|
| Osnovna škola | 2 |
| Srednja škola | 45 |
| Visoko obrazovanje | 108 |




Grafikon 2. Stepen obrazovanja ispitanika

Kao što je gore navedeno, cilj ovog istraživanja jeste da se uvrdi percepcija visokog rizika od polno prenosivih infekcija u MSM populaciji. Samim tim, u narednim rezultatima će biti predstavljeni rezultati koji se tiču rizičnog seksualnog ponašanja ispitanika, percepciju procene rizika i svesti o značaju testiranja.

U ovom istraživanju 104 ispitanika je navelo da je u poslednjih 5 godina imalo više od 5 seksualnih partnera (67%), od 2 do 4 seksualna partnera je imalo 19% ispitanika, a 14% ispitanika je imalo najviše 1 seksualnog pratnera u navedenom periodu.


| Broj seksualnih partnera u poslednjih 5 godina | |
|--|-----------------|
| Broj partnera | Broj ispitanika |
| 5+ | 104 |
| 2-4 | 30 |
| 0-1 | 21 |



Grafikon 3. Broj seksualnih partnera u poslednjih 5 godina

U poslednjih godinu dana je samo 39% ispitanika imalo zaštićene seksualne odnose. Dakle, čak 61% ispitanika navelo da je imalo makar sa jednim partnerom u poslednjih godinu dana seksualni odnos bez kondoma. Iz ovoga je lako zaključiti da se samo 1/3 ispitanika u poslednjih godinu dana nije našlo u riziku za dobijanje polno prenosivih infekcija putem nezaštićenih seksualnih odnosa.

| Broj partnera sa kojima si imao seksualni odnos bez kondoma u poslednjih godinu dana | |
|--|-----------------|
| Broj partnera | Broj ispitanika |
| 0 | 61 |
| 1 | 53 |
| 2+ | 41 |




Grafikon 4. Seksualni odnos bez kondoma u poslednjih godinu dana

Od 94 osobe koje su imale nezaštićene seksualne odnose u poslednjih godinu dana, 58% se u tom periodu testiralo na polno prenosive infekcije, dok se 42% njih testiralo pre više od godinu dana ili se nikada nije testiralo.

| Poslednje testiranje onih koji su imali nezaštićene seksualne odnose u poslednjih godinu dana | |
|---|-----------------|
| Izjava | Broj ispitanika |
| Nikada se nije testiralo | 18 |
| Pre više od 5 godina | 2 |
| pre 2-5 godina | 3 |
| pre 1-2 godine | 17 |
| u poslednjih godinu dana | 54 |

Testiranje u slučajevima kada postoji rizičan seksualni odnos u poslednjih godinu dana


■ Nikada se nije testiralo ■ Pre više od 5 godina ■ pre 2-5 godina
■ pre 1-2 godine ■ u poslednjih godinu dana



Grafikon 5. Testiranje onih koji su imali rizičan seksualni odnos u poslednjih godinu dana

Od 155 ispitanih muškaraca koji imaju seksualne odnose sa muškarcima, 13% je navelo da stupa u seksualne odnose sa novim partnerima bez upotrebe kondoma. Iako ovaj procenat ne izgleda zabrinjavajuć, čak 80% ovih osoba je imalo više partnera u istom momentu, 70% njih je imalo nezaštićene seksualne odnose sa više od 2 osobama u poslednjih godinu dana, a čak 90% njih je imalo više od 5 seksualnih partnera u prethodnih 5 godina.


| Stupanje u seksualne odnose sa novim partnerom bez kondoma | |
|--|-----------------|
| Izjava | Broj ispitanika |
| Da | 20 |
| Ne | 135 |



Grafikon 6. Stupanje u seksualne odnose sa novim partnerom bez kondoma

U ovom istraživanju 54% ispitanika je navelo da nisu u riziku za dobijanje polno prenosivih infekcija ili da je rizik veom nizak, 38% ispitanika procenjuje da je u srednjem riziku, a samo 8% ispitanika smatra da je u visokom riziku za dobijanje polno prenosivih infekcija.


| Procena rizika za dobijanje polnih bolesti | |
|--|-----------------|
| Procena | Broj ispitanika |
| Ne postoji ili nizak rizik | 84 |
| Srednji rizik | 58 |
| Visok rizik | 13 |



Grafikon 7. Procena rizika za dobijanje polno prenosivih infekcija

Međutim, ako uporedimo rezultate, možemo videti da je čak 50% onih koji su u poslednjih godinu dana imali nezaštićene seksualne odnose izjavilo da se nalazi u niskom riziku od dobijanja polno prenosivih infekcija ili da on ne postoji. Samim tim, lako je zaključiti da velik broj ispitanika koji praktikuju nezaštićene seksualne odnose ne percepira dobro rizik u kojem se nalaze.


| Procena rizika u odnosu na seksualno ponašanje: Seksualni odnos bez kondoma u poslednjih godinu dana | |
|---|-----------------|
| Procena | Broj ispitanika |
| Smatra da je u niskom riziku ili ne postoji rizik za dobijanje PPI | 47 |
| Smatra da je u srednjem riziku za dobijanje PPI | 36 |
| Smatra da je u visokom riziku za dobijanje PPI | 11 |



Grafikon 8. Procena rizika za dobijanje PPI kod osoba koje su imale rizičan seksualni odnos u poslednjih godinu dana

Pored gore navedenih rezultata istraživanja, veoma je važno prikazati i odnos onih koji smatraju da su u niskom riziku za dobijanje polno prenosivih infekcija, onih koji su imali nezaštićene seksualne odnose u poslednjih godinu dana i onih koji su se u poslednjih godinu dana testirali.

Na narednom grafikonu je lako uočljivo da se samo 24 osobe (51%) od onih koji su imali seksualne odnose bez kondoma u poslednjih godinu dana testiralo u poslednjih godinu dana na polno prenosive infekcije.



Grafikon 9. Odnos seksualnog ponašanja, procene rizika i testiranja na PPI

Da u seksualne odnose stupaju sa više partnera u istom periodu, navelo je čak 52% ispitanika. **Ono što je zabrinjavajuće kod ovog rezultata jeste što je od 80 ispitanika koji imaju seksualne odnose sa više partnera u istom periodu, čak 72,5% izjavilo da je imalo seksualne odnose bez kondoma.** Samim tim, rizik za širenje polno prenosivih infekcija među ovim ispitanicima značajno raste.

| Seksualni odnosi sa više partnera u istom periodu | |
|---|-----------------|
| Izjava | Broj ispitanika |
| Da | 80 |
| Ne | 75 |




Grafikon 10. Prikaz seksualnog ponašanja ispitanika

U ovom istraživanju je 75% ispitanika navelo da se nekada testiralo na polno prenosive infekcije, od čega je 49% njih testirano u poslednjih godinu dana.

25% ispitanika (39 osoba) je navelo da se nikada nije testiralo, 15 ispitanika je navelo da nije bilo potrebe jer uvek koriste kondom.


| Kada si se testirao na polno prenosive bolesti (HIV, hepatitis B, hepatitis C, sifilis)? | |
|--|-----------------|
| Vreme testiranja | Broj ispitanika |
| U poslednjih godinu dana | 76 |
| Pre 1-2 godina | 29 |
| Pre 2-5 godina | 5 |
| Pre više od 5 godina | 6 |
| Nikada | 39 |



Grafikon 11. Testiranje na polno prenosive bolesti ispitanika

Kod ovog pitanja, ispitanici su bili u mogućnosti da daju više različitih odgovora. Oni koji su naveli da su se testirali, najčešće su davali odgovor da su to uradili kroz rutinske provere zdravlja ili rutinske provere na polno prenosive infekcije (čak 56% odgovora), 15% odgovora je bilo da su to uradili zbog rizičnog seksualnog ponašanja, 13% jer su se plašili sopstvenog rizika i/ili rizika za partnera.


| Koji su razlozi zbog kojeg si se testirao? | |
|--|-----------------|
| Izjava | Broj ispitanika |
| Zbog putovanja u inostranstvo ili zbog dobijanja osiguranja | 8 |
| Kao deo rutinske provere na polno prenosive bolesti | 63 |
| Kao deo rutinske provere zdravlja | 57 |
| Želim da prestanem da koristim kondom u vezi | 13 |
| Plašio sam se sopstvenog rizika i/ili rizika za partnera | 27 |
| Doktor mi je preporučio da se testiram | 7 |
| Zbog rizičnog seksualnog ponašanja (seksualni odnos bez kondoma) | 33 |
| Ostalo | 6 |
| Ukupno odgovora | 214 |



Grafikon 12. Razlozi testiranja na PPI ispitanika

Čak 51% ispitanika je navelo da se testiralo na Institutu za javno zdravlje, 27% u privatnim laboratorijama, dok je ostalih 22% navelo bolnicu, Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata, akcije nevladinih organizacija i negde drugde kao mesto testiranja na polno prenosive infekcije.

| Mesto poslednjeg testiranja | |
|--|-----------------|
| Mesto | Broj ispitanika |
| Privatna laboratorija | 31 |
| U bolnici | 9 |
| Institut za javno zdravlje | 59 |
| Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata | 3 |
| Deo akcija nevladinih organizacija | 6 |
| Negde drugde | 8 |



Grafikon 13. Mesto poslednje testiranja ispitanika koji su se testirali

Od 25% ispitanika koji su naveli da se nisu nikada testirali, dobili smo 87 različitih odgovora, od kojih su najzastupljeniji odgovori: nije bilo potrebe, uvek koristim kondom (21% odgovora), imam strah od testiranja (15%), plašim se rezultata (13%), plašim se da ga neko poznat ne vidi da se testira (13%), a isto tako čak 13% odgovora je bilo da ne zna gde da se testira.

| Razlozi zbog koji se nije ispitanik testirao | | |
|---|--|-----------------|
| Izjava | | Broj ispitanika |
| Imam strah od testiranja | | 13 |
| Nije bilo potrebe, uvek koristim kondom | | 18 |
| Ne volim da imam dodira sa zdravstvenim sistemom | | 2 |
| Plašim se stigme, diskriminacije | | 6 |
| Imam strah od igala i vađenja krvi | | 5 |
| Plašim se rezultata | | 11 |
| Plašim se da me neko poznat ne vidi da se testiram | | 11 |
| Nisam znao gde da se testiram | | 11 |
| Nisam siguran da li se plaća | | 5 |
| Plašim se pravnih posledica ukoliko dobijem rezultat da sam HIV+ | | 2 |
| Nemam dovoljno znanja i informacija o značaju potrebe testiranja na HIV | | 1 |
| Ostalo | | 2 |
| Ukupno odgovora | | 87 |



Grafikon 14. Razlozi zbog kojeg se ispitanici nisu testirali

ZAKLJUČCI

Kroz ovo istraživanje nam je bilo u cilju da procenimo percepciju rizika za dobijanje polno prenosivih infekcija u MSM populaciji (mu[karci koji imaju seks sa mu[karcima]).

Na osnovu rezultata ovog istraživanja, veoma je lako zaključiti da u MSM populaciji i dalje postoji velik broj onih koji ne prepoznaju rizik kojem su izloženi, a koji je prisutan zbog rizičnih ponašanja koja praktikuju. Takođe, uočljivo je da osobe koje praktikuju nezaštićene seksualne odnose, se iz različitih razloga ne testira na polno prenosive infekcije.

Najveći broj osoba koje se nije nikada testiralo, to nije učinilo zato što zato što poseduje neke strahove poput straha od testiranja, rezultata, nedostatka anonimnosti i poverljivosti, kao i zbog nedostataka različitih informacija o testiranju.

Takođe, putem ovih rezultata smo dobili jasnu sliku o tome da većina pripadnika MSM populacije se testira na polno prenosive infekcije na 2 mesta i to Institutu za javno zdravlje ili u privatnim laboratorijama.

